

Aunque lo superen en número,
juntos podemos combatir
las bacterias que producen
la enfermedad periodontal.

DEBE ACEPTARLO.
LO SUPERAN EN NÚMERO.

ARESTIN®—junto con SRP—comienza a trabajar inmediatamente, combate la infección y la inflamación durante 30 días y brinda resultados considerablemente superiores al tratamiento con SRP solo, durante un período de hasta 90 días.^{1,2,3}

Para obtener información completa sobre prescripciones y para conocer más sobre ARESTIN®, visite www.arestin.com

ARESTIN® (minocycline hydrochloride) Microspheres, 1 mg, está indicado como complemento de los procedimientos de raspado y alisado radicular (SRP) para reducir la profundidad de las bolsas en los pacientes con periodontitis del adulto. ARESTIN® se puede utilizar como parte de un programa de mantenimiento periodontal que incluya una buena higiene bucal, y el raspado y alisado radicular. ARESTIN® contiene minocycline, un derivado de la tetraciclina, por lo cual no debe utilizarse en niños ni en mujeres embarazadas o durante la lactancia. El uso de medicamentos de la clase de las tetraciclinas durante el desarrollo dentario puede provocar la decoloración permanente de los dientes. Los efectos adversos más comunes asociados con el tratamiento fueron dolor de cabeza (9.0%), infección (7.6%), síndrome de gripe (5.0%) y dolor (4.3%). Los mismos ocurrieron en una proporción similar ante el tratamiento con SRP y SRP + placebo.

Referencias: **1.** Goodson JM, Gunsolley JC, Grossi SG, et al. Minocycline HCl microspheres reduce red-complex bacteria in periodontal disease therapy. *J Periodontol* 2007;78(8):1568-1579. **2.** Oringer RJ, Al-Shammari KF, Aldredge WA, et al. Effect of locally administered minocycline microspheres on markers of bone resorption. *J Periodontol* 2002;73:835-842. **3.** Williams RC, Paquette DW, Offenbacher S, et al. Treatment of periodontitis by local administration of minocycline microspheres: a controlled trial. *J Periodontol* 2001;72:1535-1544.

LA ENFERMEDAD PERIODONTAL CONSISTE EN
LA PRESENCIA DE MILLONES DE BACTERIAS
NOCIVAS QUE PROVOCAN DAÑOS BAJO
LA LÍNEA DE LA ENCÍA, DONDE EL CEPILLADO
Y EL HILO DENTAL NO PUEDEN LLEGAR.

Dele a sus encías la oportunidad
de luchar contra esta infección, con
ARESTIN® y tratamiento profesional.

Arestin® 
minocycline HCl 1mg
MICROSPHERES



©2009 OraPharma, Inc. A-848-09R 10/09

ARESTIN® is a registered trademark of OraPharma, Inc.

LISTERINE® Antiseptic and BRUSH, FLOSS & RINSE™ are trademarks of
Johnson & Johnson Healthcare Products Division of McNEIL-PPC, Inc.

La enfermedad periodontal es una grave infección bajo la línea de la encía.

ARESTIN® + RASPADO Y ALISADO RADICULAR (SRP) MATAN LAS BACTERIAS QUE PRODUCEN INFECCIONES PERIODONTALES.




ARESTIN® es un antibiótico que se coloca directamente en las zonas afectadas, o “bolsas”, de sus encías. Se aplica inmediatamente después del raspado y alisado radicular; el procedimiento dental que destruye la placa resistente y las bacterias que se encuentran bajo la línea de la encía.

Las microesferas de ARESTIN® liberan gradualmente minocycline, un antibiótico que mata las bacterias que producen infecciones periodontales, inflamación y sangrado.

ARESTIN® comienza a trabajar rápidamente y sigue combatiendo las bacterias mucho después de que usted se haya retirado del consultorio dental.²

ARESTIN® COMBATE LA INFECCIÓN Y LA INFLAMACIÓN DURANTE 30 DÍAS Y PROPORCIONA MEJORES RESULTADOS QUE EL TRATAMIENTO CON SRP SOLO, DURANTE UN PERÍODO DE HASTA 90 DÍAS.^{1,2,3}


PARA ENTENDER EL SIGNIFICADO DE SUS NÚMEROS.



Una bolsa de 4 mm o de mayor tamaño puede indicar la presencia de una infección.

DENTRO DE SU BOCA

FECHA: _____



NOTAS:

Después del tratamiento con ARESTIN®

A continuación encontrará algunas medidas simples para obtener los máximos resultados en su tratamiento.

- Evite ingerir alimentos duros, crujientes o pegajosos durante **una semana**.
- No toque las zonas tratadas durante **una semana**.
- Espere **10 días** antes de usar hilo dental alrededor de las zonas tratadas.

Recuerde:

- Mantenga una buena higiene bucal, mediante una rutina diaria de BRUSH, FLOSS & RINSE™, que consiste en cepillado, uso de hilo dental y enjuague, usando un enjuague antimicrobiano aceptado por la ADA, como LISTERINE® Antiseptic. Use el producto según las instrucciones.
- Haga un seguimiento con su dentista y su encargado de higiene dental, cumpliendo con las citas programadas.